

*Chelonius*  
*Cryptosodii*

(Pl. I. IV.).

*Emys bicolor* Bert. mss.

Bicolore, noire et roussâtre: tête verdâtre et rayée de rouge et de jaunâtre: une tache ovale et rougeâtre sur les côtés de la tête; dessous du col et de la mâchoire jaune rayé longitudinalement de vert: poitrine antérieures rayées en avant de vert et de jaune. Carapace costière de 13 écaillées centrales et 25 marginales. Plastron formé de 12 écailles. Queue bicolore unique et pointue.

Habite les champs de la côte septentrionale et orientale du Mexique, depuis les rives du Pomeo jusqu'aux bords du rio Sabina. Elle va quelquefois dans les ruisseaux et les marais. Sa chair est agréable.

Longueur de la carapace	5 p.	6 h.
Grand diamètre de la carapace	4 "	3 "
Longueur du plastron	5 "	0 "
id. de la tête	1 "	6 "
largeur de la tête	• 0 "	11 "
longueur des pattes antérieures	2 "	6 "
id. idem postérieures	3 "	3 "
id. de la queue	1 "	6 "
longueur de la fente mandibulaire	0 "	6 à 7 "

Tête oblongue, aplatie en dessus et prolongée antérieurement en coin. Sur le col et les joues verdâtre et marquée de lignes roussâtres. Dessous des mâchoires et du col jaune raié longitudinalement de verdâtre. Une tache ovale irrégulière et rouge en arrière des yeux. Narines fort petites, arrondies et situées en avant. Yeux de gran-

-deux moyenne à iris jaune-verdâtre. Bouche inférieure, la lèvre supérieure bordée d'une raye roussâtre.

Corps. Carapace lisse, convexe, ovale, un peu plus large en arrière qu'en avant et comme dentelée à son bord postérieur: on y compte 13 écailles centrales, dont 5 sur la ligne médiane, marquées longitudinalement de vert noir et de roussâtre, et quatre latérales dont les rayes s'étendent sur les flancs. Les écailles marginales sont au nombre de 25: l'antérieure est petite presque quadrilatère et munie d'une raye rouge longitudinale; les autres sont plus ou moins carrées, ornées d'une espèce d'ail à leur côté postérieur et comme marbrées de vert pâle et de roux. - Plastron moins long et beaucoup moins large que la carapace, composé de 12 écailles roussâtre avec une tache noire au milieu: leur forme est diverse, les antérieures et postérieures sont anguleuses, celles du milieu presque carrées.

Pattes les antérieures plus courtes que les postérieures, rayées en avant de vert et de jaune; ces dernières se prolongent jusque sur les doigts et ceux-ci sont unis par une membrane dentelée et armée d'ongles allongés. Les postérieures sont renflées en dedans bordées d'une ligne jaune en arrière et rayées de vert et de jaune en dehors; les ongles sont plus pointus et les doigts sont unis par une membrane aussi dentelée. Les pieds et les mains sont aplatis et les onguilles qui recouvrent les extrémités sont transversales et peu consistantes.

Queue courte, conique, granglante, terminée en pointe, couverte de lignes vertes et roussâtres longitudinales. L'anus est assez grand et percé presque au milieu de la queue.

La carapace des plus grands individus de cette espèce atteint jusqu'à un pied de longueur.

